

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Энемафосфо®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Энемафосфо®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Натрия гидрофосфат + Натрия дигидрофосфат

**Лекарственная форма:** раствор ректальный

**Состав**

1 флакон препарата содержит:

*действующие вещества:* натрия гидрофосфата гептагидрат – 7,2 г, натрия дигидрофосфата моногидрат – 19,2 г;

*вспомогательные вещества:* натрия бензоат – 0,48 г, фосфорная кислота концентрированная - до рН от 5,0 до 5,8, вода очищенная - до 120 мл.

**Описание**

Прозрачный, бесцветный раствор.

**Фармакотерапевтическая группа**

Слабительное средство

**Код АТХ**

A06AG01

**Фармакологические свойства**

Энемафосфо® - солевое слабительное, действие которого основано на увеличении с помощью осмотических процессов задержки воды в просвете кишечника. Накопление жидкости в кишке приводит к усилению перистальтики и последующему очищению кишечника. Время наступления эффекта – 5-7 минут после введения.

**Показания к применению**

- запор;
- подготовка к эндоскопическому исследованию прямой кишки;
- подготовка к рентгенологическому исследованию органов брюшной полости;
- подготовка к хирургическим операциям на органах брюшной полости, родам.

**Противопоказания**

Индивидуальная гиперчувствительность, непроходимость кишечника, перфорация кишечника, острый геморрой, трещины заднего прохода, острые воспалительные и/или язвенные поражения дистальных отделов желудочно-кишечного тракта, детский возраст.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Клинические исследования у беременных женщин не проводились, поэтому применение препарата не рекомендуется, и возможно по показаниям, когда потенциальная польза превышает риск применения.

### **Способ применения и дозы**

Ректально, по 120 мл (1 флакон).

Перед применением снять крышку с флакона. Достать из упаковки канюлю. Установить канюлю на флакон. Лечь на левый бок, согнув правую ногу в колене, и аккуратно ввести канюлю в анальное отверстие, надавив с небольшим усилием в направлении пупка. Выдавить содержимое флакона и вынуть канюлю из анального отверстия. Необязательно выдавливать содержимое до конца, поскольку флакон содержит 15 мл избытка препарата. Рекомендуется удерживать препарат в кишечнике 8-10 минут. Рекомендуемое положение тела следует сохранять до наступления позывов к опорожнению.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, боли в животе, местнораздражающее действие (раздражение вокруг анального отверстия).

Если любые из указанных выше побочных действий появляются или усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные действия не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Передозировка при ректальном способе введения маловероятна. Может наблюдаться диарея, нарушение водно-электролитного баланса, обезвоживание.

При первых признаках передозировки следует обратиться к врачу. Лечение симптоматическое: гидратационная терапия, противодиарейные средства.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не выявлено.

Однако следует проконсультироваться с врачом, если пациент принимает антикоагулянты, препараты дигиталиса, ципрофлоксацин, этидронат, полистиренсульфонат натрия или антибиотики тетрациклиненового ряда.

### **Особые указания**

В случае появления тошноты, рвоты, болей в брюшной полости проконсультируйтесь с врачом.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Форма выпуска**

Раствор ректальный.

По 120 мл во флаконы для однократного применения из полиэтилена высокого давления, с навинчивающейся крышкой из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, комплектующиеся канюлей для ректального введения из полиэтилена высокого давления с односторонней пропускающей прокладкой. Каждый флакон вместе с канюлей и инструкцией по применению в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение**

ООО «Мелон», Россия

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 15-линия, д. 28, пом. 1Н.

**Производитель**

АО «ВЕРТЕКС», Россия

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «ВЕРТЕКС», Россия

199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-линия, д. 27, лит. А.

Тел./факс:

Представитель АО «ВЕРТЕКС»



С.А. Копатько